

VRAGEN OM TE STELLEN

Vragen vóór toediening

1. Ooit een onmiddellijke of ernstige allergische reactie gehad na toediening van een vaccin of na inname van een geneesmiddel waarvoor dringende medische zorgen nodig waren?
2. Vandaag koorts of symptomen met vermoeden van een acute infectie?
3. Positieve coronatest minder dan 14 dagen voor vaccinatie?
4. Verhoogde bloedingsneiging (lang nabloeden bij wonden) of gebruik van antistollingsmedicatie (Marcoumar, Marevan, Sintrom) of Aspirine?

- | | |
|--------------|--|
| + op vraag 1 | = niet vaccineren, verwijzing naar een allergoloog is aangewezen |
| + op vraag 2 | = vaccinatie uitstellen tot na volledig herstel |
| + op vraag 3 | = vaccinatie uitstellen tot 14 dagen na de positieve test of tot 14 dagen na genezing bij ziekteklachten |
| + op vraag 4 | = blijf afduwen/afdrukken tot 2 minuten na vaccinatie |

Vaccinatiekaart met instructies -01/03/21 - <https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie-professionelen/>

27/09/2023

INFORMEREN

Symptomen na vaccinatie ⁽⁴⁾

- pijn op de injectieplaats
- vermoeidheid
- hoofdpijn
- myalgie
- koorts, rillingen

Geruststellen over de symptomen na de vaccinatie ⁽⁴⁾

- niet-systematisch, voorbijgaand en niet-alarmerend
- indien nodig kan paracetamol worden genomen om de post-vaccinatiesymptomen te behandelen

Mogelijkheid om paracetamol te nemen

- dosering voor gezonde volwassenen: max. 4 g/d
- dosering voor cachectische volwassenen, leverinsufficiëntie, overige: max. 3 g/d

27/09/2023



ALLERGIEËN ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾

Absolute contra-indicatie voor vaccinatie

- vermoede of bevestigde allergie of overgevoeligheid voor een van de hulpstoffen van het vaccin

Relatieve contra-indicaties voor vaccinatie

- de volgende tabellen raadplegen die de stratificatie van het allergierisico vóór en na de eerste vaccindosis weergeven
- mogelijkheid om te vaccineren onder scherp toezicht of in het ziekenhuis